


Diretrizes de tratamentos oncológicos

Gliomas



Apresentação

Esta diretriz tem como objetivo apoiar as decisões clínicas no tratamento de gliomas. As diretrizes seguem níveis pré-definidos de evidência científica e força por trás de cada recomendação (Sistema Grade). Não são objetivos dessas diretrizes recomendações a respeito de considerações fisiopatológicas sobre as doenças. Cada opção terapêutica recomendada foi avaliada quanto à relevância clínica, mas também quanto ao impacto econômico. Assim, algumas alternativas podem ser recomendadas dentro de um cenário de restrição orçamentária no sistema público de saúde brasileiro.

AUTORES

Coordenação

Comitê de Tumores do Sistema Nervoso Central SBOC

Dra. Camilla Akemi Felizardo Yamada

Dra. Caroline Chaul de Lima

Dra. Fabiana Spillari Viola

Dr. Flávio Silva Brandão

Dr. Gustavo Duarte Ramos Matos

Dr. Roberto Abramoff

Dra. Clarissa Baldotto

Diretrizes de tratamentos oncológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC | Capítulo "Gliomas".
DATA DE PUBLICAÇÃO 19/05/2025 **PRESIDENTE** Dra. Angélica Nogueira **PRESIDENTE ELEITA** Dra. Clarissa Baldotto **PRESIDENTE DE HONRA** Dra. Anelisa Coutinho **DIRETORIA** Dr. André Sasse, Dra. Aline Lauda, Dr. Cristiano Resende, Dra. Daniele Assad, Dra. Danielle Laperche, Dr. Duílio Rocha Filho, Dr. Rodrigo Guedes, Dr. Romualdo Barroso e Dr. William William **CONSELHO FISCAL** Dra. Aknar Calabrich, Dr. Fábio Franke e Dr. Fernando Meton **ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO** Rafael Luis Moura Lima do Carmo (DUO Consultoria e Design) **PROJETO GRÁFICO** Bruno de Jorge (DUO Consultoria e Design) **ILUSTRAÇÕES** Evelyn Gonçalves (DUO Consultoria e Design) (Ilustração da capa baseada na obra "As Três Graças" de Rafael Sanzio, 1505) **CONTATO SBOC** Av. Paulista, 2073, Horsa II, cj. 1003 - Conjunto Nacional - CEP: 01311-300 - São Paulo/SP **TELEFONES** (11) 3179.0090, (11) 3192.9284

Lista de abreviaturas

AE1/AE3	Citoqueratinas AE1/AE3
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ATRX	Gene ou proteína <i>Alpha thalassemia X-linked Intellectual disability syndrome</i>
CDKN2A/B	<i>Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A/B</i>
CIC	Repressor transcricional Capicua
DWI	<i>Diffusion weighted imaging</i>
ECOG	<i>Eastern Cooperative Oncology Group</i>
EGFR	<i>Epidermal growth factor receptor</i>
EORTC/NCIC	<i>European Organisation for Research and Treatment of Cancer/ National Cancer Information Center</i>
EV	Endovenoso
FLAIR	<i>Fluid attenuated inversion recovery</i>
FR	Força de recomendação
GBM	Glioblastoma
GFAP	<i>Glial fibrillar acidic protein</i>
HR	<i>Hazard ratio</i>
IC	Intervalo de confiança
IDH	Isocitrato desidrogenase
IHQ	Imuno-histoquímica
IMRT	<i>Intensity-modulated radiotherapy</i> (radioterapia de intensidade modulada)
KPS	<i>Karnofsky performance score</i>
MGMT	O6-Metilguanina-DNA Metiltransferase
NE	Nível de evidência
NGS	<i>Next-generation sequencing</i>
NTRK	<i>Gene Neurotrophic tyrosine receptor kinase</i>
PCV	Procarbazina, Lomustina e Vincristina
PS	<i>Performance status</i>
QT	Quimioterapia
RM	Ressonância magnética
RT	Radioterapia
RTOG	<i>Radiation Therapy Oncology Group</i>
SG	Sobrevida global
SLP	Sobrevida livre de progressão
SWI	<i>Susceptibility weighted imaging</i>
TERT	Telomerase da transcriptase reversa
VO	Via oral

Estadiamento

Para tumores primários do SNC não se aplica o estadiamento baseado no tamanho do tumor, LFN e presença de metástase (TNM).

Os gliomas difusos do tipo adulto, segundo a classificação vigente, associa dados morfológicos a informações moleculares, que são fundamentais para o diagnóstico definitivo.¹

Tipo	Graus	Marcadores moleculares
Astrocitoma, <i>IDH</i> -mutado	2, 3, 4	<i>IDH1</i> , <i>IDH2</i> , <i>ATRX</i> , p53, <i>CDKN2A/B</i>
Oligodendroglioma <i>IDH</i> -mutado e 1p/19q codeletado	2, 3	<i>IDH1</i> , <i>IDH2</i> , 1p/19q, <i>TERT</i> , <i>CIC</i> , <i>FUBP1</i> , <i>NOTCH1</i>
Glioblastoma, <i>IDH</i> -selvagem	4	<i>TERT</i> , <i>EGFR</i> , cromossomos +7/-10

Os termos NOS (*not otherwise specified*) e NEC (*not elsewhere classified*) devem ser utilizados para se referir a tumores não submetidos a uma avaliação molecular completa ou tumores cuja avaliação molecular não permitiu uma classificação adequada na terminologia atual, respectivamente.

Avaliação inicial

História e exame físico detalhados

Ênfase no exame neurológico. Sugerimos a utilização da escala NANO (*Neurologic Assessment in Neuro Oncology*)² como ferramenta para avaliação do *status* neurológico.

Avaliar a ocorrência de crises convulsivas, uso de anticonvulsivantes, reações alérgicas e medicamentos utilizados.

História familiar para doenças oncológicas.

Exames de imagem

RM do crânio com contraste, incluindo as sequências T1, T2, T2 Flair, T1 pós-contraste, difusão (DWI), perfusão e imagem ponderada em susceptibilidade (SWI). A espectroscopia, embora não obrigatória, pode auxiliar na avaliação.

Exames laboratoriais

Hemograma completo;
Coagulograma;
Bioquímica (incluindo eletrólitos e funções hepática e renal).

Anatomia patológica

Análise morfológica

- Tipo celular;
- Anaplasia;
- Vascularização;
- Necrose (padrão e extensão);
- Atividade mitótica.

Análise imuno-histoquímica (IHQ)

O painel de IHQ é definido pelo patologista e pode incluir os seguintes marcadores a depender da suspeita clínica:

- GFAP, AE1/AE3, *IDH1*, ATRX, p53, Ki67, H3K27M, H3G34 e H3K27me.

Análise molecular

Sequenciamento (NGS) para *IDH1* e *IDH2* é recomendado em pacientes com gliomas difusos com *IDH1* não expresso por IHQ nas seguintes situações:

- Pacientes com idade < 55 anos;
- Pacientes com história pregressa de gliomas difusos.

Pesquisa da codeleção 1p/19q é recomendada para confirmar diagnóstico de oligodendroglioma.

Pesquisa da metilação da região promotora de MGMT é recomendada em pacientes com diagnóstico de glioblastomas.


Pesquisa de *BRAF-V600E* pode ser avaliada por IHQ e sequenciamento. Considerar intervenção na recorrência.

Pesquisa de Fusões de *NTRK* podem ser avaliadas por sequenciamento gênico e tal alteração deve ser considerada para tratamento no cenário recorrente (não recomendada IHQ).

Os testes moleculares devem respeitar o organograma a seguir:

Organograma para solicitação de testes moleculares e IHQ³

Glioma difuso astrocítico ou Oligodendroglioma



Tratamento

Cirurgia

A ressecção máxima segura é a recomendação preferencial nos pacientes com suspeita de glioma difusos, mesmo naqueles com achado incidental. Caso não seja possível a ressecção macroscópica total, proceder com ressecção parcial ou biópsia.

Deve-se proceder com biópsia ou ressecção subtotal caso a ressecção completa não seja considerada segura **NE ALTO/FR FORTE**.



Considerações e bases científicas para recomendações

A cirurgia é uma importante modalidade diagnóstica e terapêutica nos gliomas difusos. A ressecção macroscópica total é recomendada desde que seja possível, com o mínimo de risco para sequelas relacionadas ao procedimento. A ressecção parcial ou biópsia devem ser realizadas em lesões em áreas eloquentes.^{4,5}

Inúmeros estudos retrospectivos foram realizados para avaliação entre observação com imagens seriadas *versus* ressecção cirúrgica precoce em pacientes com gliomas de baixo grau. Um desses estudos avaliou dados de dois diferentes centros noruegueses, um que favorecia biópsia e observação, e o outro, ressecção cirúrgica precoce. O centro que favorecia ressecção precoce teve uma SG significativamente maior, com sobrevida em 5 anos de 74%, comparada a 60% no centro que favoreceu biópsia e observação.⁶

O grau de ressecção também parece impactar em SG. Estudo prospectivo de Kiliç *et al.* demonstrou que extensão da ressecção - total, subtotal ou biópsia - teve impacto em relação à taxa de recorrência e diferenciação tumoral.⁷

Gliomas *IDH*-mutados grau 2 (Astrocitoma *IDH*-mutado grau 2 e Oligodendroglioma *IDH*-mutado e 1p19q codeletado grau 2)

Tratamento adjuvante

Baixo risco

- Observação (vide discussão abaixo em "Considerações e bases científicas para recomendações") **NE MODERADO/FR FORTE**.

Alto risco

- RT seguida PCV 6 ciclos **NE ALTO/FR FORTE**;
- RT seguida de Temozolamida adjuvante 6-12 ciclos **NE ALTO/FR FORTE**.



Considerações e bases científicas para recomendações

Os pacientes com gliomas de baixo grau são estratificados baseado em características clínicas. Classicamente, são considerados de alto risco aqueles com idade ≥ 40 anos, KPS ≤ 70 , sintomas neurológicos à apresentação inicial, diferenciação astrocítica, ressecção subtotal ou biopsia.⁸ A extensão da ressecção deve ser individualizada como critério de risco.

A RT adjuvante isolada (doses de 50 a 54 Gy em frações de 1,8 a 2 Gy por 5 a 6 semanas), quando comparada a observação com tratamento radioterápico na progressão da doença, não demonstrou ganho de SG em estudos fase III.⁹ Sendo assim, e considerando os efeitos a longo prazo dessa modalidade, não se indica rotineiramente a RT isolada após tratamento cirúrgico inicial.

O estudo fase III RTOG 9802 randomizou pacientes com gliomas grau 2 de alto risco (idade ≥ 40 anos e/ou submetidos a ressecção parcial ou biopsia) para RT isolada ou RT seguida de QT (PCV: lomustina, procarbazona e vincristina).¹⁰ Após um seguimento prolongado (mediana de 11,9 anos), observou-se um ganho significativo em SG com a terapia combinada (SG mediana de 13,3 *versus* 7,8 anos). Análise molecular *post-hoc* demonstrou benefício do tratamento com PCV nos gliomas de alto risco *IDH*-mutados com e sem a codeleção 1p19q (HR 0,21; $p=0,029$ e HR 0,38; $p=0,013$ respectivamente), sem impacto em SG nos gliomas *IDH*-selvagens (HR 0,96; $p=0,94$).¹¹

Apesar da existência de dados robustos para o uso de PCV adjuvante, este esquema tem sido amplamente substituído por temozolomida nos últimos estudos clínicos devido ao melhor perfil de toxicidade e à expectativa de que ambos agentes alquilantes devam ter eficácia similar. No entanto, não há comparação direta entre os dois esquemas.

O estudo fase II RTOG 0424 investigou a RT com temozolomida concomitante e adjuvante comparada a controles históricos, demonstrando ganho de SG.¹²

É importante ressaltar que astrocitomas originalmente grau 2, *IDH*-mutados, com a presença da deleção de *CDKN2A/B* são classificados atualmente como astrocitomas grau 4. Recomenda-se, portanto, tratamento como glioma de alto grau *IDH*-mutado aos moldes do estudo Catnon.

Doença recorrente

Cirurgia

Cirurgia com ressecção macroscópica total **NE ALTO/FR FORTE**.

Tratamento complementar

Pacientes em observação (sem adjuvância prévia):

- RT (54 Gy) seguida de PCV 6 ciclos como tratamento definitivo (em pacientes não abordados cirurgicamente) ou como adjuvância após nova ressecção **NE MODERADO/FR FORTE**.
- RT (54 Gy) seguida de Temozolamida adjuvante 6 a 12 ciclos **NE MODERADO/FR FORTE**.
- RT isolada em casos selecionados **NE MODERADO/FR FRACA**.

Pacientes submetidos a tratamento adjuvante:

- Mudança de regime quimioterápico, caso haja progressão em vigência de tratamento adjuvante inicial **NE ALTO/FR FORTE**:
 - PCV;
 - Temozolamida;
 - Esquemas baseados em platina;
 - Dabrafenibe e trametinibe nos pacientes com mutação *BRAF-V600E*;
 - Larotrectinibe nos pacientes com fusões *NTRK*.
- Considerar reirradiação seguida de QT (esquema a depender de tratamento prévio), especialmente se RT prévia há mais de 2 anos ou nova lesão fora do campo inicial **NE MODERADO/FR FORTE**.
- Considerar protocolo de pesquisa, se disponível.



Considerações e bases científicas para recomendações

Na recorrência, recomenda-se discussão multidisciplinar. A cirurgia tem papel importante naqueles pacientes que não foram submetidos à cirurgia adequada na apresentação inicial, quando é possível a ressecção macroscópica total, para alívio de sintomas ou ainda na necessidade de reavaliação molecular.

As recomendações de tratamento quimioterápico na doença recorrente em pacientes tratados previamente com RT e QT são baseadas em estudos fase II, como o uso de temozolomida, carboplatina e etoposídeo.¹³⁻¹⁵ Existem poucos dados em relação ao tratamento de pacientes com gliomas de baixo grau recorrente ou em progressão que não receberam RT previamente. Resultados do RTOG 9802 suportam o uso de RT seguida de PCV nesse grupo de pacientes.¹⁰

A terapia alvo dirigida tem papel no cenário recorrente e, se possível, devem ser pesquisadas alterações em *BRAF* e *NTRK*.

Pacientes com gliomas de baixo grau e mutação de *BRAF-V600E* foram incluídos no Roar *trial* que avaliou a combinação de dabrafenibe e trametinibe na recorrência pós tratamento padrão com taxa de resposta de 50% sendo portanto uma recomendação nesse cenário.¹⁶ Pacientes adultos com glioma de baixo grau e fusão de *NTRK* na recidiva foram tratados com larotrectinibe e todos tiveram controle de doença na avaliação de 24 semanas e resposta naqueles com doença mensurável.¹⁷

Astrocitomas *IDH*-mutados graus 3 e 4

RT (59,4 Gy/30 frações) seguido de Temozolamida adjuvante 12 ciclos **NE ALTO/FR FORTE**.

RT (59,4 Gy) + Temozolamida concomitante, seguido de Temozolamida adjuvante 12 ciclos **NE BAIXO/FR FRACA**:

- Esta recomendação deve ser discutida em pacientes com astrocitoma *IDH*-mutado grau 4.

Pacientes que não toleram o tratamento multimodal por idade ou comorbidades:

- Temozolamida adjuvante 12 ciclos **NE MODERADO/FR FORTE**;
- RT isolada **NE MODERADO/FR FORTE**;
- Terapia de suporte isolada **NE MODERADO/FR FORTE**.



Considerações e bases científicas para recomendações

A primeira análise interina do estudo randomizado Catnon, de quatro braços contendo 748 pacientes portadores de gliomas grau 3 não-codeletados 1p19q, demonstrou que os pacientes tratados com RT seguido de temozolomida tiveram aumento da SLP (19 *versus* 42,8 meses; $p=0,003$) e SG (41,1 *versus* mediana ainda não alcançada; $p<0,0001$) comparado à RT isolada. A segunda análise interina deste mesmo trabalho não demonstrou benefício em temozolamida concomitante à RT com SG 66,9 *versus* 60,4 meses sem concomitância (HR 0,97; $p=0,76$) e confirmou benefício da manutenção em SG (82,3 *versus* 46,9 meses; HR 0,64 IC 95% 0,52-0,79; $p<0,0001$), definindo assim o tratamento padrão nos gliomas difusos grau 3 *IDH*-mutados, não codeletados.^{14,15}

O estudo de fase III NOA-04 avaliou a RT isolada pós-operatória seguido de QT na progressão *versus* QT adjuvante isolada deixando a RT para progressão em 318 pacientes portadores de astrocitoma grau 3 (53%), oligoastrocitoma grau 3 (33%) e oligodendroglioma (14%). Os esquemas utilizados foram temozolomida ou PCV. Após seguimento mediano de 9,5 anos, não houve diferença no tempo para falência do tratamento – que era o objetivo primário – ou na SG entre começar com a RT ou QT.¹⁶

Oligodendroglioma *IDH*-mutado 1p19q codeletado grau 3

RT (60 Gy) seguido de PCV 6 ciclos **NE ALTO/FR FORTE**.

RT (60 Gy) seguido de Temozolamida adjuvante 12 ciclos **NE MODERADO/FR FORTE**.



Considerações e bases científicas para recomendações

Dois estudos randomizados demonstraram aumento da SLP e SG com o tratamento adjuvante com RT seguido de PCV em pacientes com oligodendrogliomas grau 3.²⁰⁻²² O Eortc 26951 randomizou 368 pacientes para receberem RT apenas ou seguido de 6 ciclos de RT e PCV.²¹ Após seguimento mediano de 60 meses, houve diferença na SLP favorecendo o braço da adição do PCV (23 *versus* 13 meses; $p=0,003$) com diferença na SG após um seguimento mais prolongado (42 *versus* 31 meses; $p=0,018$).²² Os pacientes codeletados foram os que apresentaram melhor prognóstico e maior benefício da adição da QT. O segundo estudo foi o RTOG 9402 com 291 pacientes portadores de oligodendrogliomas grau 3 ou oligo-astrocitomas grau 3 e corroborou os dados anteriores demonstrando aumento da SLP e SG com o tratamento multimodal de RT e PCV nos pacientes codeletados.²³

Não há estudos randomizados de pacientes tratados isoladamente com QT comparando PCV e temozolomida. O estudo NOA-04 (acima descrito) incluiu oligodendrogliomas grau 3, porém não tem poder estatístico suficiente para comparar desfechos entre os braços de PCV e temozolomida.²⁴ Devido à posologia, à tolerância e aos resultados positivos em outros subtipos de alto grau, o uso da temozolomida torna-se uma opção nesse cenário. No entanto, é o estudo fase III Codel (em andamento) que se propõe a comparar diretamente os dois regimes em gliomas grau 2 e 3 com codeleção de 1p/19q. Os dois braços do estudo são RT seguida de PCV e RT com Temozolomida concomitante e adjuvante. Os dados, ansiosamente aguardados, devem responder essa importante questão.

Glioblastoma e Astrocitoma *IDH*-selvagem*

Idade < 70 anos e/ou bom PS (KPS ≥ 60%):

- RT 3D ou IMRT + Temozolamida concomitante, seguida de Temozolamida adjuvante 6 ciclos **NE ALTO/FR FORTE**.

Idade ≥ 70 anos e bom PS (KPS ≥ 60%):

- RT hipofracionada (40 Gy/15 frações) + Temozolamida concomitante, seguida de Temozolamida adjuvante 6 a 12 ciclos **NE ALTO/FR FORTE**.

PS ECOG 3-4 ou KPS < 60%:

- MGMT metilado: Temozolamida adjuvante 6 a 12 ciclos **NE MODERADO/FR FORTE**;
- MGMT não-metilado: RT isolada (40 Gy/15 frações ou 25 Gy/5 frações) **NE MODERADO/FR FORTE**;
- Terapia de suporte isolada **NE MODERADO/FR FORTE**.



Considerações e bases científicas para recomendações

O estudo do Eortc/NCIC randomizou 573 pacientes entre 18 e 70 anos portadores de GBM para receberem RT de campo envolvido apenas ou combinado a temozolomida diário seguido de temozolomida mensal por 6 ciclos.²⁴ O tratamento combinado foi associado a uma maior SG (14,6 *versus* 12,1 meses; HR 0,63; $p < 0,0001$). O seguimento de longo prazo mostrou uma sobrevida de 27% em 2 anos no braço combinado *versus* 11% no braço da RT isolada.²⁵ A metilação do MGMT mostrou-se um fator prognóstico significativo de sobrevida e benefício da QT,²⁶ porém, na ausência de estratégias efetivas para os pacientes não-metilados, o tratamento combinado de RT com temozolomida seguido de manutenção continua sendo o padrão em pacientes jovens e com bom KPS.

Um estudo randomizado de fase III com 562 pacientes acima de 65 anos comparou RT hipofracionada (40 Gy/15 frações) isolada *versus* associada a temozolomida concomitante e adjuvante. Houve aumento na SLP (5,3 *versus* 3,9 meses; HR 0,50; $p < 0,001$) e SG (9,3 *versus* 7,6 meses; HR 0,67; $p < 0,001$) no braço da terapia combinada consolidando o tratamento multimodal em pacientes idosos com boa condição clínica.²⁷

Para avaliar o tratamento unimodal na população mais idosa, o estudo NOA-08, randomizou 373 pacientes > 65 anos portadores de GBM (90%) ou astrocitoma grau 3 (10%) para tratamento de RT isolada (60 Gy/30 frações) ou temozolomida 100 mg/m²/dia por 7 dias a cada 14 dias.²⁸ Não houve diferença na SG entre os dois grupos. Também foi demonstrado que a presença de metilação do MGMT esteve associada a melhor sobrevida e os pacientes metilados tratados inicialmente com temozolomida tiveram maior tempo livre de evento, sendo o inverso para os pacientes não-metilados, ou seja, melhor desfecho quando inicialmente tratados com RT.

Já o estudo do Nordic Clinical Brain Tumor Study Group randomizou 342 pacientes portadores de GBM acima de 60 anos para um de três braços: RT na dose padrão de 60 Gy/30 frações ou RT hipofracionada 34 Gy/10 frações ou temozolomida 200 mg/m²/dia por 5 dias a cada 28 dias.²⁹ O braço da temozolomida apresentou SG significativa maior do que a RT padrão (8,3

versus 6,0 meses; HR 0,70; IC 95% 0,52-0,93), porém similar à RT hipofracionada (8,4 *versus* 7,5 meses; HR 0,82; IC 95% 0,63-1,06). Similar ao estudo anterior, pacientes metilados tratados com temozolomida tiveram maior SG do que os não-metilados (9,7 *versus* 6,8 meses; HR 0,34; IC 95% 0,34-0,93).

Estudo prospectivo recentemente publicado não demonstrou benefício da manutenção além dos 6 ciclos de TMZ nos pacientes que não apresentaram progressão nos 6 ciclos, independentemente do *status* de metilação de MGMT.³⁰

Um ponto importante a ser ressaltado é o desafio da distinção entre recorrência e pseudoprogressão em pacientes com tumores MGMT metilados, principalmente dentro dos primeiros 3 meses depois de terminar a TMZ concomitante à RT.³¹ É importante seguir os critérios do RANO para avaliação de resposta.³²

*Os astrocitomas *IDH*-selvagem, pela última classificação, são considerados glioblastomas, caso tenham grau histológico 4 ou ao menos uma das seguintes alterações: mutação de *TERT*, amplificação de *EGFR* ou ganho do cromossomo 7/perda do cromossomo 10.¹

Doença recorrente

Cirurgia com ressecção macroscópica total, especialmente se intervalo livre de progressão $\geq$ 6 meses [NE MODERADO/FR FORTE](#).

Mudança de regime quimioterápico caso haja progressão em vigência de tratamento adjuvante inicial ou em intervalo menor que 6 meses após término do mesmo [NE MODERADO/FR FORTE](#).

Considerar re-irradiação seguida de QT (esquema a depender de tratamento prévio), especialmente se RT prévia > 2 anos ou nova lesão fora do campo inicial [NE MODERADO/FR FORTE](#).

QT isolada [NE MODERADO/FR FRACA](#)

- Temozolomida isolada;
- Lomustina isolada;
- PCV;
- Carmustina isolada;
- Regimes baseados em platina.

Bevacizumabe 5-10 mg/kg EV a cada 2-4 semanas + QT (especialmente em pacientes com edema cerebral e dependentes de corticoterapia) [NE MODERADO/FR FORTE](#).

Terapia de suporte clínico isolada [NE MODERADO/FR FORTE](#).



Considerações e bases científicas para recomendações

A SG mediana no GBM recorrente é inferior a 1 ano e geralmente os pacientes tem sintomas que impactam na qualidade de vida. A definição do tratamento deve ser discutido por equipe multidisciplinar incluindo cuidados paliativos, considerando sempre o *performance status*, toxicidade do tratamento e benefícios.

Reabordagem cirúrgica deve ser ponderada somente em pacientes com bom PS, intervalo livre de progressão superior a 6 meses, ausência de envolvimentoependimário e possibilidade de ressecção macroscópica total.³³

Lomustina, temozolomida e bevacizumabe são os agentes mais estudados no glioma de alto grau recorrente.

O retratamento com temozolomida, em dose tradicional ou intensa, pode ser utilizado especialmente em pacientes com longo intervalo para progressão e MGMT metilado. O estudo de fase II Rescue avaliou temozolomida 50 mg/m²/dia de forma contínua. A SLP em 6 meses foi maior para pacientes que completaram a terapia adjuvante.³⁴

Bevacizumabe foi estudado de forma isolada ou combinado à QT, como lomustina. Estudo de fase III Eortc 26101 avaliou o benefício do acréscimo do bevacizumabe à lomustina. Observou-se incremento em SLP de 4,2 *versus* 1,5 meses sem impacto em SG. O acréscimo do bevacizumabe melhorou a SLP e taxa de resposta, mas não a SG, dado esse confirmado em trabalho de fase III Eortc 26101.³⁵ Os trabalhos mais recentes vêm demonstrando o benefício em controle de sintomas com doses menores de bevacizumabe mas ainda não há um consenso sobre a dose ideal que deva ser utilizada.³⁶ Em caso de reirradiação, considerar associação com bevacizumabe baseado nos dados do RTOG 1205, que, a despeito de não ter incremento em SG, demonstrou aumento de SLP de 7,1 *versus* 3,8 meses e SLP em 6 meses de 29,1 para 54,3%.³⁷

Importante:

- A procarbazina e a lomustina não são mais produzidas no Brasil.
- Na indisponibilidade de lomustina, esta pode ser substituída por carmustina.³⁸

Terapia alvo

Pacientes com mutação *BRAF* V600E:

- Dabrafenibe + Trametinibe.

Pacientes com fusão do gene *NTRK*:

- Larotrectinibe.



Considerações e bases científicas para recomendações

Considerar tratamentos com alvo terapêuticos no cenário de doença recidivada, previamente submetidos a tratamento padrão.

Mutações de *BRAF* V600E são identificados em 5-15% dos gliomas de baixo grau, 10% dos astrocitomas pilocíticos e menos frequentemente nos gliomas de alto grau, correspondendo a 3% dos GBM. Estudo fase II, *The ROAR trial*, avaliou o uso de dabrafenibe 150 mg, duas vezes por dia, em associação ao trametinibe 2 mg por dia, em pacientes com gliomas de alto e baixo grau refratários ou recorrentes, evidenciando benefício em taxa de resposta objetiva e benefício clínico durável.³⁹

A fusão do gene *NTRK* ocorre em mais de 2% dos adultos com tumores primários do SNC e em cerca de 5,3% dos gliomas de alto grau pediátricos e 2,5% dos gliomas pediátricos de baixo grau. Estudos avaliando o uso de larotrectinibe em pacientes com tumores primários de SNC recorrentes e refratários com presença de fusão do gene *NTRK* evidenciaram ganho de 30% de taxa de resposta (IC 95% 16-49) em tumores de alto e baixo grau, independente do subtipo e do tipo de fusão do gene *NTRK*. A taxa de controle da doença em 24 semanas foi de 73%. A dose recomendada para adultos é de 100 mg, duas vezes por dia.⁴⁰

Seguimento

Procedimentos e exames a serem realizados NE MODERADO/FR ALTA

- História e exame neurológico, com ênfase em novos sintomas, a cada 3-6 meses.

Revisão recente analisou estudos publicados e propôs recomendações sobre o seguimento dos pacientes com gliomas, visto a ausência de estudos prospectivos e limitações dos dados existentes com limitado nível de evidência.⁴¹

Recomendações para seguimento com exame de imagem:⁴¹

Classificação tumoral	Frequência de realização de RM
Oligodendroglioma, <i>IDH</i> -mutado, 1p/19q codeletado, grau 2	Após RT + QT: pelo menos a cada 6-9 meses até progressão Após RT ou QT: a cada 3-4 meses por 5 anos e, após, manter a cada 3-4 meses (máximo a cada 6 meses) até progressão Após cirurgia exclusiva: a cada 3-4 meses até progressão; em caso de ressecção macroscópica total, a cada 6-9 meses por 5 anos até progressão
Astrocitoma, <i>IDH</i> -mutado, grau 2	Após RT + QT: cada 6 meses até progressão Após RT ou QT: a cada 3-4 meses por 5 anos e, após, manter a cada 3-4 meses (máximo a cada 6 meses) até progressão Após cirurgia exclusiva: a cada 3-4 meses até progressão
Oligodendroglioma, <i>IDH</i> -mutado, 1p/19q codeletado, grau 3	Após RT + QT: pelo menos a cada 6-9 meses até progressão Após RT ou QT: a cada 3-4 meses por 5 anos e, após, manter a cada 3-4 meses (máximo a cada 6 meses) até progressão
Astrocitoma, <i>IDH</i> -mutado, grau 3	Após RT + QT: pelo menos a cada 6 meses até progressão Após RT ou QT: a cada 3-4 meses até progressão
Oligodendroglioma recorrente, <i>IDH</i> -mutado, 1p/19q codeletado, graus 2 e 3	A cada 3-4 meses
Astrocitoma recorrente, <i>IDH</i> -mutado, graus 2 e 3	A cada 2-3 meses
GBM/Astrocitoma <i>IDH</i> -selvagem	A cada 2-3 meses

Adaptado de: Jo J, van den Bent MJ, Nabors B, Wen PY, Schiff D. Surveillance imaging frequency in adult patients with lower-grade (WHO Grade 2 and 3) gliomas. *Neuro-Oncol.* 1o de julho de 2022;24(7):1035–47.

Referências

1. Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA, Figarella-Branger D, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Neuro-Oncology*. 2021 Aug 2;23(8):1231–51.
2. Nayak L, DeAngelis LM, Brandes AA, Peereboom DM, Galanis E, Lin NU, et al. The Neurologic Assessment in Neuro-Oncology (NANO) scale: a tool to assess neurologic function for integration into the Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteria. *Neuro-Oncology*. 2017 May 1;19(5):625–35.
3. Weller M, van den Bent M, Preusser M, Le Rhun E, Tonn JC, Minniti G, et al. EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood. *Nat Rev Clin Oncol*. março de 2021;18(3):170–86.
4. Wijnenga MMJ, French PJ, Dubbink HJ, Dinjens WNM, Atmodimedjo PN, Kros JM, et al. The impact of surgery in molecularly defined low-grade glioma: an integrated clinical, radiological, and molecular analysis. *Neuro Oncol*. 2018 Jan 10;20(1):103–12.
5. Smith JS, Chang EF, Lamborn KR, Chang SM, Prados MD, Cha S, et al. Role of extent of resection in the long-term outcome of low-grade hemispheric gliomas. *J Clin Oncol*. 2008 Mar 10;26(8):1338–45.
6. Jakola AS, Myrnes KS, Kloster R, Torp SH, Lindal S, Unsgård G, et al. Comparison of a strategy favoring early surgical resection vs a strategy favoring watchful waiting in low-grade gliomas. *JAMA*. 2012 Nov 14;308(18):1881–8.
7. Kiliç T, Ozduman K, Elmaci I, Sav A, Necmettin Pamir M. Effect of surgery on tumor progression and malignant degeneration in hemispheric diffuse low-grade astrocytomas. *J Clin Neurosci*. 2002 Sep;9(5):549–52.
8. Pignatti F, van den Bent M, Curran D, Debruyne C, Sylvester R, Therasse P, et al. Prognostic factors for survival in adult patients with cerebral low-grade glioma. *J Clin Oncol*. 2002 Apr 15;20(8):2076–84.
9. Karim AB, Maat B, Hatlevoll R, Menten J, Rutten EH, Thomas DG, et al. A randomized trial on dose-response in radiation therapy of low-grade cerebral glioma: European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Study 22844. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 1996 Oct 1;36(3):549–56.
10. Buckner JC, Shaw EG, Pugh SL, Chakravarti A, Gilbert MR, Barger GR, et al. Radiation plus Procarbazine, CCNU, and Vincristine in Low-Grade Glioma. *N Engl J Med*. 2016 Apr 7;374(14):1344–55.
11. Bell EH, Zhang P, Shaw EG, Buckner JC, Barger GR, Bullard DE, et al. Comprehensive Genomic Analysis in NRG Oncology/RTOG 9802: A Phase III Trial of Radiation Versus Radiation Plus Procarbazine, Lomustine (CCNU), and Vincristine in High-Risk Low-Grade Glioma. *J Clin Oncol*. 2020 Oct 10;38(29):3407–17.

- 12.** Fisher BJ, Pugh SL, Macdonald DR, Chakravatri A, Lesser GJ, Fox S, et al. Phase 2 Study of a Temozolomide-Based Chemoradiation Therapy Regimen for High-Risk, Low-Grade Gliomas: Long-Term Results of Radiation Therapy Oncology Group 0424. *Int J Rad Oncol Biol Phys*. 2020 Jul;107(4):720–5.
- 13.** Kesari S, Schiff D, Drappatz J, LaFrankie D, Doherty L, Macklin EA, et al. Phase II study of protracted daily temozolomide for low-grade gliomas in adults. *Clin Cancer Res*. 2009 Jan 1;15(1):330–7.
- 14.** Moghrabi A, Friedman HS, Ashley DM, Bottom KS, Kerby T, Stewart E, et al. Phase II study of carboplatin (CBDCA) in progressive low-grade gliomas. *Neurosurg Focus*. 1998 Apr 15;4(4):e3.
- 15.** Brandes AA, Basso U, Vastola F, Tosoni A, Pasetto LM, Jirillo A, et al. Carboplatin and teniposide as third-line chemotherapy in patients with recurrent oligodendroglioma or oligoastrocytoma: a phase II study. *Ann Oncol*. 2003 Dec;14(12):1727–31.
- 16.** Wen PY, Stein A, van den Bent M, De Greve J, Wick A, de Vos FYFL, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAFV600E-mutant low-grade and high-grade glioma (ROAR): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2, basket trial. *Lancet Oncol*. 2022 Jan;23(1):53–64.
- 17.** Doz F, Van Tilburg CM, Geoerger B, Højgaard M, Øra I, Boni V, et al. Efficacy and safety of larotrectinib in TRK fusion-positive primary central nervous system tumors. *Neuro-Oncology*. 2022 Jun 1;24(6):997–1007.
- 18.** van den Bent MJ, Baumert B, Erridge SC, Vogelbaum MA, Nowak AK, Sanson M, et al. Interim results from the CATNON trial (EORTC study 26053-22054) of treatment with concurrent and adjuvant temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma: a phase 3, randomised, open-label intergroup study. *Lancet*. 2017 Oct 7;390(10103):1645–53.
- 19.** van den Bent MJ, Tesileanu CMS, Wick W, Sanson M, Brandes AA, Clement PM, et al. Adjuvant and concurrent temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma (CATNON; EORTC study 26053-22054): second interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 study. *Lancet Oncol*. 2021 Jun;22(6):813–23.
- 20.** Wick W, Roth P, Hartmann C, Hau P, Nakamura M, Stockhammer F, et al. Long-term analysis of the NOA-04 randomized phase III trial of sequential radiochemotherapy of anaplastic glioma with PCV or temozolomide. *Neuro Oncol*. 2016 Nov;18(11):1529–37.
- 21.** van den Bent MJ, Carpentier AF, Brandes AA, Sanson M, Taphoorn MJB, Bernsen HJJA, et al. Adjuvant procarbazine, lomustine, and vincristine improves progression-free survival but not overall survival in newly diagnosed anaplastic oligodendrogliomas and oligoastrocytomas: a randomized European Organisation for Research and Treatment of Cancer phase III trial. *J Clin Oncol*. 2006 Jun 20;24(18):2715–22.

- 22.** van den Bent MJ, Brandes AA, Taphoorn MJB, Kros JM, Kouwenhoven MCM, Delattre JY, et al. Adjuvant procarbazine, lomustine, and vincristine chemotherapy in newly diagnosed anaplastic oligodendroglioma: long-term follow-up of EORTC brain tumor group study 26951. *J Clin Oncol*. 2013 Jan 20;31(3):344–50.
- 23.** Cairncross G, Wang M, Shaw E, Jenkins R, Brachman D, Buckner J, et al. Phase III trial of chemoradiotherapy for anaplastic oligodendroglioma: long-term results of RTOG 9402. *J Clin Oncol*. 2013 Jan 20;31(3):337–43.
- 24.** Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJB, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. *N Engl J Med*. 2005 Mar 10;352(10):987–96.
- 25.** Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJB, Janzer RC, et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. *Lancet Oncol*. 2009 May;10(5):459–66.
- 26.** Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, Hamou MF, de Tribolet N, Weller M, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. *N Engl J Med*. 2005 Mar 10;352(10):997–1003.
- 27.** Perry JR, Laperriere N, O’Callaghan CJ, Brandes AA, Menten J, Phillips C, et al. Short-Course Radiation plus Temozolomide in Elderly Patients with Glioblastoma. *N Engl J Med*. 2017 Mar 16;376(11):1027–37.
- 28.** Wick W, Platten M, Meisner C, Felsberg J, Tabatabai G, Simon M, et al. Temozolomide chemotherapy alone versus radiotherapy alone for malignant astrocytoma in the elderly: the NOA-08 randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2012 Jul;13(7):707–15.
- 29.** Malmström A, Grønberg BH, Marosi C, Stupp R, Frappaz D, Schultz H, et al. Temozolomide versus standard 6-week radiotherapy versus hypofractionated radiotherapy in patients older than 60 years with glioblastoma: the Nordic randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2012 Sep;13(9):916–26.
- 30.** Balana C, Vaz MA, Manuel Sepúlveda J, Mesia C, Del Barco S, Pineda E, et al. A phase II randomized, multicenter, open-label trial of continuing adjuvant temozolomide beyond 6 cycles in patients with glioblastoma (GEINO 14-01). *Neuro Oncol*. 2020 Dec 18;22(12):1851–61.
- 31.** Brandes AA, Franceschi E, Tosoni A, Blatt V, Pession A, Tallini G, et al. MGMT Promoter Methylation Status Can Predict the Incidence and Outcome of Pseudoprogression After Concomitant Radiochemotherapy in Newly Diagnosed Glioblastoma Patients. *J Clin Oncol*. 1o de maio de 2008;26(13):2192–7.
- 32.** Wen PY, van den Bent M, Youssef G, Cloughesy TF, Ellingson BM, Weller M, et al. RANO 2.0: Update to the Response Assessment in Neuro-Oncology Criteria for High- and Low-Grade Gliomas in Adults. *J Clin Oncol*. 2023 Nov 20;41(33):5187–99.

- 33.** Park CK, Kim JH, Nam DH, Kim CY, Chung SB, Kim YH, et al. A practical scoring system to determine whether to proceed with surgical resection in recurrent glioblastoma. *Neuro Oncol.* 2013 Aug;15(8):1096–101.
- 34.** Perry JR, Bélanger K, Mason WP, Fulton D, Kavan P, Easaw J, et al. Phase II trial of continuous dose-intense temozolomide in recurrent malignant glioma: RESCUE study. *J Clin Oncol.* 2010 Apr 20;28(12):2051–7.
- 35.** Wick W, Gorlia T, Bendszus M, Taphoorn M, Sahm F, Harting I, et al. Lomustine and Bevacizumab in Progressive Glioblastoma. *N Engl J Med.* 2017 Nov 16;377(20):1954–63.
- 36.** Melhem JM, Tahir A, Calabrese E, Granovskaya I, Atenafu EG, Sahgal A, et al. Dose-dependent efficacy of bevacizumab in recurrent glioblastoma. *J Neurooncol.* fevereiro de 2023;161(3):633–41.
- 37.** Tsien CI, Pugh SL, Dicker AP, Raizer JJ, Matuszak MM, Lallana EC, et al. NRG Oncology/RTOG1205: A Randomized Phase II Trial of Concurrent Bevacizumab and Reirradiation Versus Bevacizumab Alone as Treatment for Recurrent Glioblastoma. *J Clin Oncol.* 2023 Feb 20;41(6):1285–95.
- 38.** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) - Central Nervous System Cancer Version 5.2024. Disponível em: <https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1425>
- 39.** Wen PY, Stein A, van den Bent M, De Greve J, Wick A, de Vos FYFL, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with BRAFV600E-mutant low-grade and high-grade glioma (ROAR): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2, basket trial. *Lancet Oncol.* 2022 Jan;23(1):53–64.
- 40.** Doz F, van Tilburg CM, Geoerger B, Højgaard M, Øra I, Boni V, et al. Efficacy and safety of larotrectinib in TRK fusion-positive primary central nervous system tumors. *Neuro-Oncology.* 2021 Nov 27;noab274.
- 41.** Jo J, van den Bent MJ, Nabors B, Wen PY, Schiff D. Surveillance imaging frequency in adult patients with lower-grade (WHO Grade 2 and 3) gliomas. *Neuro-Oncol.* 1o de julho de 2022;24(7):1035–47.

É profissional da saúde?

Conheça os benefícios de ser associado SBOC:



Redução na inscrição do Congresso SBOC que pode chegar a mais de 50% nos primeiros lotes



Biblioteca Virtual com acesso gratuito a aproximadamente 900 periódicos, como Nature Cancer, The Lancet Oncology e JAMA Oncology



Participação nas atividades da Escola Brasileira de Oncologia, como programas educacionais e de atualização



Uso da sede SBOC para reuniões e aulas virtuais mediante agendamento



Networking profissional



Acesso ao SBOC Review, uma seleção periódica de artigos científicos recém-publicados nas melhores revistas da especialidade



Valores reduzidos para realização do exame de obtenção do Título de Especialista em Oncologia Clínica



Acesso às pesquisas clínicas em andamento no país cadastradas no site da SBOC, com possibilidade de encaminhar pacientes



Simplificação do processo de associação à ASCO e à ESMO (com direito a gratuidade na entidade europeia)

Residentes em Oncologia Clínica não pagam anuidade!

Acesse o site
e associe-se:

