

**SBOC**

SOCIEDADE  
BRASILEIRA  
DE ONCOLOGIA  
CLÍNICA

DIRETRIZES DE  
TRATAMENTOS  
ONCOLÓGICOS

2026

TUMORES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR

# CARCINOMAS NEUROENDÓCRINOS EXTRAPULMONARES

Colaboração

 grupo brasileiro  
de tumores  
gastrointestinais

## Apresentação

Esta diretriz tem como objetivo apoiar as decisões clínicas no tratamento de carcinomas neuroendócrinos extrapulmonares. As diretrizes seguem níveis pré-definidos de evidência científica e força por trás de cada recomendação (Sistema Grade). Não são objetivos dessas diretrizes recomendações a respeito de considerações fisiopatológicas sobre as doenças. Cada opção terapêutica recomendada foi avaliada quanto à relevância clínica, mas também quanto ao impacto econômico. Assim, algumas alternativas podem ser recomendadas dentro de um cenário de restrição orçamentária no sistema público de saúde brasileiro.

### AUTORES

#### Coordenação

Comitê de Tumores do Trato Gastrointestinal Superior SBOC

Dra. Maria Ignez Freitas Melro Braghioli

Dr. João Fogacci

Dra. Juliana Florinda de Mendonça Rêgo

Dra. Luiza Dib Batista Bugiato Faria

Dr. Paulo Henrique Costa Diniz

Dr. Williams Fernandes Barra

Dra. Marcela Crosara

#### Colaboração

Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais (GTG)

Diretrizes de tratamentos oncológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC | Capítulo "Carcinomas neuroendócrinos extrapulmonares" DATA DE PUBLICAÇÃO 16/05/2026 PRESIDENTE Dra. Clarissa Baldotto PRESIDENTE ELEITO Dr. Fábio Franke PRESIDENTE DE HONRA Dra. Angélica Nogueira DIRETORIA Dr. André Sasse, Dra. Daniele Assad, Dra. Danielle Laperche, Dr. Helano Carioca, Dra. Marcela Crosara, Dr. Max Senna Mano, Dr. Rodrigo Guedes, Dr. Romualdo Barroso, Dr. William William CONSELHO FISCAL Dra. Aknar Calabrich, Dra. Ana Amélia Viana e Dr. José Aurílio Rocha ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO Rafael Luis Moura Lima do Carmo (DUO Consultoria e Design) PROJETO GRÁFICO Bruno de Jorge (DUO Consultoria e Design) CONTATO SBOC Av. Paulista, 2073, Horsa II, cj. 1003 - Conjunto Nacional - CEP: 01311-300 - São Paulo/SP TELEFONES (11) 3179.0090, (11) 3192.9284

## Lista de abreviaturas

---

CGA	Campos de grande aumento
CNE	Carcinomas neuroendócrinos
Enets	<i>European Neuroendocrine Tumor Society</i>
FR	Força de recomendação
MSI-H	<i>Microsatellite instability-high</i> (alta instabilidade de microssatélites)
NE	Nível de evidência
OMS	Organização Mundial da Saúde
PET/CT	<i>Positron emission tomography/computed tomography</i>
QT	Quimioterapia
RECIST	<i>Response Evaluation Criteria in Solid Tumors</i>
RM	Ressonância magnética
RT	Radioterapia
SG	Sobrevida global
SLP	Sobrevida livre de progressão
TC	Tomografia computadorizada
TNE	Tumor neuroendócrino

# Introdução

A classificação 2010 da OMS definia como carcinomas neuroendócrinos pouco diferenciados:<sup>1</sup>

- Carcinomas neuroendócrinos G3\* de pequenas células;
- Carcinomas neuroendócrinos G3 de grandes células.

Esta classificação foi atualizada em 2019, mudando a definição do grupo G3 para todas as neoplasias neuroendócrinas gastroenteropancreáticas:<sup>2</sup>

- TNE bem diferenciado G3: > 20 mitoses por 10 CGA ou Ki67 > 20%;
- Carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado (células pequenas ou grandes) G3: > 20 mitoses por 10 CGA ou Ki67 > 20%.

Os carcinomas neuroendócrinos extrapulmonares mais frequentes são os gastroenteropancreáticos (GEP), sendo também encontrados em bexiga, colo uterino, próstata e cabeça e pescoço.

Neste capítulo, abordaremos especificamente os carcinomas neuroendócrinos G3.

Em relação ao estadiamento, assim como utilizado para os carcinomas de pequenas células de pulmão, o PET/CT com FDG deve ser recomendado (se disponível), e não o PET/CT com Gálio-68.

\* Grau 3: Ki-67 >20% ou > 20 mitoses por 10 CGA.

# Tratamento

## Doença locorregional

---

QT baseada em platina concomitante à RT NE MODERADO/FR FORTE.

Considerar cirurgia com intenção curativa se procedimento de baixa morbidade e possibilidade de ressecção R0 NE MODERADO/FR FORTE.

Em caso de cirurgia primária, favorecemos QT adjuvante com ou sem RT NE BAIXO/FR FORTE.

### Considerações e bases científicas para recomendações

Em virtude do alto índice proliferativo e extrapolando dados sobre tratamento do carcinoma de pequenas células de pulmão, terapias combinadas envolvendo QT, RT e/ou cirurgia parecem ser a melhor alternativa para sobrevida de longo prazo.<sup>3</sup>

Para pacientes submetidos a cirurgia como tratamento inicial, a alta agressividade desta histologia determina a indicação de QT (cisplatina associada a etoposídeo) com ou sem RT (concomitante ou sequencial) na maioria dos casos, apesar da inexistência de ensaios clínicos randomizados para adjuvância.

# Doença metastática

## 1ª linha

QT baseada na combinação de platina com etoposídeo ou platina com irinotecano

NE MODERADO/FR FORTE :

Observação: neste cenário, a cisplatina e a carboplatina mostraram resultados equivalentes.

Regimes de irinotecano e/ou oxaliplatina em combinação com 5-FU são opções interessantes, particularmente nos carcinomas neuroendócrinos cujo tumor primário está localizado no trato gastrointestinal:

Folfirinox NE BAIXO/FR FORTE ;<sup>4</sup>

Folfox (RP = 29%) NE BAIXO/FR FORTE ;<sup>5</sup>

Folfiri (RP = 31%) NE BAIXO/FR FORTE .<sup>6</sup>

## 2ª linha

QT citotóxica:

Folfiri (paciente que não receberam irinotecano previamente) NE BAIXO/FR FORTE ;

Temozolomida NE BAIXO/FR FORTE ;

Topotecano NE BAIXO/FR FORTE ;

Paclitaxel NE BAIXO/FR FORTE ;

Docetaxel NE BAIXO/FR FORTE ;

Gencitabina NE BAIXO/FR FORTE ;

Vinorelbina NE BAIXO/FR FORTE ;

Dacarbazina NE BAIXO/FR FORTE .

Imunoterapia:

Pembrolizumabe monoterapia para tumores MSI-H NE ALTO/FR FORTE .<sup>7-9</sup>

### Considerações e bases científicas para recomendações

Devido à semelhança histológica, muitas vezes o tratamento é extrapolado daquele utilizado em carcinoma de pequenas células de pulmão, com esquemas baseados em platina.

O tratamento de 1ª linha com cisplatina e etoposídeo é baseado em 2 estudos que demonstraram taxas de resposta de 67% e 42% e medianas de sobrevida de 19 e 15 meses.<sup>5,6</sup> Substituições de cisplatina por carboplatina e de etoposídeo por irinotecano são alternativas eficientes.<sup>10,11</sup>

Os regimes de 2ª linha tendem a ser muito pouco efetivos, com taxas de resposta que raramente atingem 20%.<sup>12,13</sup> Drogas com atividade neste cenário incluem topotecano, paclitaxel, docetaxel, gencitabina, vinorelbina e dacarbazina.

No estudo de fase II randomizado Prodigie 41-Bevanec, pacientes com CNE gastroenteropancreáticos foram randomizados para tratamento de 2ª linha com Folfiri ou Folfiri e bevacizumabe após progressão a platina e etoposídeo. A sobrevida foi semelhante entre os grupos, porém de certa forma esse estudo confirma a eficácia do Folfiri, uma vez que 60% dos pacientes estavam vivos em 6 meses.<sup>14</sup>

Classicamente, uma das maiores séries já publicadas de carcinomas neuroendócrinos gastrointestinais avançados avaliou 305 casos de países nórdicos.<sup>15</sup> Nesta série, pacientes com tumores com Ki67 < 55% tiveram 15% de resposta à QT baseada em platina *versus* 42% se Ki67 > 55% ( $p < 0,001$ ), avaliados por Recist. Entretanto, o grupo com Ki-67 < 55% se mostrou de melhor prognóstico, com mediana de sobrevida de 14 meses *versus* 10 meses ( $p < 0,05$ ) para o grupo com Ki67 > 55%.

Neste mesmo estudo, não houve diferença do uso de cisplatina ou carboplatina, bem como o benefício de sobrevida foi idêntico para pacientes que obtiveram resposta objetiva ou doença estável.<sup>15</sup>

A coorte prospectiva multicêntrica Nordic NEC 2 incluiu 698 pacientes com diagnóstico de NEC (N=511) e NET G3 (N=128). Nesse estudo, olhando especificamente para a população de NEC, 426 iniciaram tratamento de primeira linha, 83% receberam QT baseada em platina (carbo/cisplatina + etoposídeo). A SG foi de 7,4 meses com SLP na primeira linha de 6,1 meses. Não houve diferença na SG entre os grupos NEC com Ki67 maior ou menor que 55%.<sup>16</sup>

Estudo de 2ª linha após progressão à platina mostrou 33% de resposta com temozolomida isolada ou em combinação, sendo que pacientes com Ki67 < 60% obtiveram melhores respostas.<sup>17</sup>

Em relação à imunoterapia, os dados da literatura mostram a sua eficácia nos tumores MSI-H/ dMMR, sendo a aprovação agnóstica de pembrolizumabe neste cenário já bem estabelecida.

Em pacientes com CNE de alto grau MSS/pMMR previamente tratados, a combinação de ipilimumabe e nivolumabe foi avaliada no estudo fase II Dart (Swog S1609), um ensaio do tipo *basket* que incluiu coortes de tumores raros, entre elas neoplasias neuroendócrinas de alto grau. Nessa coorte, foi observada taxa de resposta objetiva de aproximadamente 42%, com SG mediana de 11 meses, sugerindo potencial atividade do duplo bloqueio imunológico nesse cenário.<sup>18</sup> Mais recentemente, o estudo fase II randomizado Nipinec avaliou nivolumabe isolado *versus* nivolumabe associado ao ipilimumabe em pacientes com CNE avançado previamente tratados com QT baseada em platina. Os resultados demonstraram atividade limitada da imunoterapia nesse contexto, com benefício modesto e sem evidência conclusiva de superioridade da combinação, reforçando que o papel dessa estratégia permanece incerto e deve ser considerado principalmente em casos selecionados ou no contexto de estudos clínicos.<sup>19</sup> Necessita-se de um estudo de fase III para confirmar estes resultados.

## Seguimento

Não há evidência disponível na literatura que demonstre benefício em realizar exames específicos após o tratamento;

Entretanto, por tratarem-se de neoplasias de alto índice proliferativo, com recidivas precoces e sobrevida curta, o acompanhamento dos sítios mais comuns de metástases com exames de imagem (TC/RM) a cada 90 dias é desejável [NE BAIXO/FR FORTE](#) ;

Cromogranina A sérica é expressa de maneira heterogênea e atualmente o seu uso não é indicado [NE BAIXO/FR FORTE](#) .<sup>20,21</sup>

## Referências

1. Bosman FT, World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, organizadores. WHO classification of tumours of the digestive system. 4th ed. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2010. 417 p. (World Health Organization classification of tumours).
2. Klimstra DS, Kloppel G, La Rosa S, Rindi G. Digestive System Tumours. In: WHO Classification of Tumours. 5th edition. Vol 1. IARC, Lyon, 2019.
3. Nagtegaal ID, Odze RD, Klimstra D, et al. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system. *Histopathology*. 2020;76: 182-188.
4. Zhu J, Strosberg JR, Dropkin E, Strickler JH. Treatment of High-Grade Metastatic Pancreatic Neuroendocrine Carcinoma with FOLFIRINOX. *J Gastrointest Cancer*. 2015 Jun;46(2):166–9.
5. Hadoux J, Malka D, Planchard D, Scoazec JY, Caramella C, Guigay J, et al. Post-first-line FOLFOX chemotherapy for grade 3 neuroendocrine carcinoma. *Endocr Relat Cancer*. 2015 Jun;22(3):289–98.
6. Hentic O, Hammel P, Couvelard A, Rebours V, Zappa M, Palazzo M, et al. FOLFIRI regimen: an effective second-line chemotherapy after failure of etoposide-platinum combination in patients with neuroendocrine carcinomas grade 3. *Endocr Relat Cancer*. 2012 Dec;19(6):751–7.
7. Le DT, Durham JN, Smith KN, Wang H, Bartlett BR, Aulakh LK, et al. Mismatch repair deficiency predicts response of solid tumors to PD-1 blockade. *Science*. 28 de julho de 2017;357(6349):409–13.
8. Le DT, Kim TW, Van Cutsem E, Geva R, Jäger D, Hara H, et al. Phase II Open-Label Study of Pembrolizumab in Treatment-Refractory, Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair-Deficient Metastatic Colorectal Cancer: KEYNOTE-164. *J Clin Oncol*. 2020 Jan 1;38(1):11–9.
9. Marabelle A, Le DT, Ascierto PA, Di Giacomo AM, De Jesus-Acosta A, Delord JP, et al. Efficacy of Pembrolizumab in Patients With Noncolorectal High Microsatellite Instability/Mismatch Repair-Deficient Cancer: Results From the Phase II KEYNOTE-158 Study. *J Clin Oncol*. 2020 Jan 1;38(1):1–10.
10. Moertel CG, Kvols LK, O'Connell MJ, Rubin J. Treatment of neuroendocrine carcinomas with combined etoposide and cisplatin. Evidence of major therapeutic activity in the anaplastic variants of these neoplasms. *Cancer*. 15 de julho de 1991;68(2):227–32.
11. Mitry E, Baudin E, Ducreux M, Sabourin JC, Rufié P, Aparicio T, et al. Treatment of poorly differentiated neuroendocrine tumours with etoposide and cisplatin. *Br J Cancer*. dezembro de 1999;81(8):1351–5.

- 12.** Kulke MH, Wu B, Ryan DP, Enzinger PC, Zhu AX, Clark JW, et al. A phase II trial of irinotecan and cisplatin in patients with metastatic neuroendocrine tumors. *Dig Dis Sci.* junho de 2006;51(6):1033–8.
- 13.** Ramella Munhoz R, de Mendonça Rego JF, de Celis Ferrari AR, Ignez Braghiroli M, Mendonça Bariani G, Marcelo Hoff P, et al. Combination of Irinotecan and a Platinum Agent for Poorly Differentiated Neuroendocrine Carcinomas. *Rare Tumors* [Internet]. 4 de setembro de 2013 [citado 6 de janeiro de 2020];5(3). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804814/>.
- 14.** Walter T, Lievre A, Coriat R, Malka D, Elhajbi F, Di Fiore F, et al. Bevacizumab plus FOLFIRI after failure of platinum-etoposide first-line chemotherapy in patients with advanced neuroendocrine carcinoma (PRODIGE 41-BEVANEC): a randomised, multicentre, non-comparative, open-label, phase 2 trial. *Lancet Oncol.* 2023 Mar;24(3):297–306.
- 15.** Brenner B, Shah MA, Gonen M, Klimstra DS, Shia J, Kelsen DP. Small-cell carcinoma of the gastrointestinal tract: a retrospective study of 64 cases. *Br J Cancer.* 4 de maio de 2004;90(9):1720–6.
- 16.** Sorbye H, Hjortland GO, Vestermark LW, Ladekarl M, Svensson J, Sundlöv A, et al. Characteristics and treatment outcome in a prospective cohort of 639 advanced high-grade digestive neuroendocrine neoplasms (NET G3 and NEC): the NORDIC NEC 2 study. *Br J Cancer.* 2025 Aug;133(3):316-324.
- 17.** Cicin I, Karagol H, Uzunoglu S, Uygun K, Usta U, Kocak Z, et al. Extrapulmonary small-cell carcinoma compared with small-cell lung carcinoma: a retrospective single-center study. *Cancer.* 1o de setembro de 2007;110(5):1068–76.
- 18.** Patel SP, Mayerson E, Chae YK, Strosberg J, Wang Y, Lee JH, et al. A phase II basket trial of dual anti-CTLA-4 and anti-PD-1 blockade in rare tumors (DART SWOG S1609): high-grade neuroendocrine neoplasm cohort. *Clin Cancer Res.* 2021;27(17):4874-4881.
- 19.** Hadoux J, Malka D, Planchard D, Scoazec JY, Caramella C, Guigay J, et al. Nivolumab with or without ipilimumab in patients with advanced neuroendocrine carcinoma previously treated with platinum-based chemotherapy (NIPINEC): a randomized phase II trial. *J Clin Oncol.* 2024;42(16):1891-1901.
- 20.** Sorbye H, Welin S, Langer SW, Vestermark LW, Holt N, Osterlund P, et al. Predictive and prognostic factors for treatment and survival in 305 patients with advanced gastrointestinal neuroendocrine carcinoma (WHO G3): the NORDIC NEC study. *Ann Oncol.* janeiro de 2013;24(1):152–60.
- 21.** Welin S, Sorbye H, Sebjornsen S, Knappskog S, Busch C, Oberg K. Clinical effect of temozolomide-based chemotherapy in poorly differentiated endocrine carcinoma after progression on first-line chemotherapy. *Cancer.* 15 de outubro de 2011;117(20):4617–22.

## ANEXO 1

# Sistema Grade de níveis de evidência e força da recomendação

## Níveis de evidência

Nível	Definição	Implicações	Fonte de informação
Alto	Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.	É improvável que trabalhos adicionais irão modificar a confiança na estimativa do efeito.	- Ensaios clínicos bem delineados, com amostra representativa. - Em alguns casos, estudos observacionais bem delineados, com achados consistentes*.
Moderado	Há confiança moderada no efeito estimado.	Trabalhos futuros poderão modificar a confiança na estimativa de efeito, podendo, inclusive, modificar a estimativa.	- Ensaios clínicos com limitações leves**. - Estudos observacionais bem delineados, com achados consistentes*.
Baixo	A confiança no efeito é limitada.	Trabalhos futuros provavelmente terão um impacto importante em nossa confiança na estimativa de efeito.	- Ensaios clínicos com limitações moderadas**. - Estudos observacionais comparativos: coorte e caso controle.
Muito baixo	A confiança na estimativa de efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos achados.	Qualquer estimativa de efeito é incerta.	- Ensaios clínicos com limitações graves**. - Estudos observacionais comparativos presença de limitações**. - Estudos observacionais não comparados***. - Opinião de especialistas.

## Força de recomendação

Público alvo	Forte	Fraca (condicional)
Gestores	A recomendação deve ser adotada como política de saúde na maioria das situações	É necessário debate substancial e envolvimento das partes interessadas
Pacientes	A maioria dos indivíduos desejaria que a intervenção fosse indicada e apenas um pequeno número não aceitaria essa recomendação	Grande parte dos indivíduos desejaria que a intervenção fosse indicada; contudo alguns indivíduos não aceitariam essa recomendação
Profissionais de saúde	A maioria dos pacientes deve receber a intervenção recomendada	O profissional deve reconhecer que diferentes escolhas serão apropriadas para cada paciente para definir uma decisão consistente com os seus valores e preferências

# É PROFISSIONAL DA SAÚDE?

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS DE SER ASSOCIADO(A) SBOC:



**Biblioteca Virtual** com acesso gratuito a mais de **900 periódicos**, como Nature Cancer, The Lancet Oncology e JAMA Oncology



**Visibilidade profissional**, com a possibilidade de ser convidado(a) para palestrar em eventos da SBOC ou integrar os Comitês da instituição



**Uso da sede SBOC** para reuniões e aulas virtuais mediante agendamento



**Networking profissional**



**Redução na inscrição do Congresso SBOC** que pode chegar a mais de **50%** nos primeiros lotes



**Acesso a cursos e eventos na OncoAcademy** – a nova plataforma educacional da SBOC



**Acesso ao SBOC Review**, uma seleção periódica de artigos científicos recém-publicados nas melhores revistas da especialidade



**Simplificação do processo de associação à ASCO e à ESMO** (com direito à gratuidade na entidade europeia)



Possibilidade de participação do programa de **Capacitação em Pesquisa Clínica**



Redução de, pelo menos, **40%** no valor da inscrição do exame para a **Prova de Título de Especialista em Oncologia Clínica**

**RESIDENTES MÉDICOS EM ONCOLOGIA CLÍNICA NÃO PAGAM ANUIDADE!**

**SBOC**

SOCIEDADE  
BRASILEIRA  
DE ONCOLOGIA  
CLÍNICA

**ASSOCIE-SE  
AQUI!**

